

## 含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン

### 目 次

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 第 1 章 緒言                | 第 5 章 溶出挙動の同等性の判定     |
| 第 2 章 用語                | 付録                    |
| 第 3 章 製剤の処方変更水準と要求される試験 | 1. f2 関数と溶出率比較時点      |
| 1. 製剤の処方変更水準            | 2. ラグ時間による溶出曲線の補正方法   |
| 2. 要求される試験              | 3. フィルム層の溶出に対する影響の評価法 |
| 第 4 章 溶出試験              | 4. 製剤の処方変更水準と要求される試験  |

### 第 1 章 緒言

本ガイドラインは、既承認の経口固形製剤と有効成分、効能・効果、用法・用量及び剤形は同一で、有効成分の含量が異なる（以下、「含量違い」という）製剤の生物学的同等性試験の実施方法の原則を示したものであり、含量違い製剤を同じ用量で服用したときの生物学的同等性を保証することを目的としている。

既承認の製剤からの処方変更の程度に応じて、異なる試験を実施する。

### 第 2 章 用語

#### 基準処方

臨床試験で有効性及び安全性が確認された、又はヒトを対象とした生物学的同等性試験により先発医薬品との同等性が確認された製剤の処方。

#### 標準製剤

既承認の製剤 3 ロットにつき、以下の①あるいは②の試験液で、第 4 章に示した溶出試験を行い（ただし、毎分 50 回転のパドル法のみ、試験回数 6 ベッセル以上）、中間の溶出性を示すロットの製剤を標準製剤とする。ただし、A 水準の変更においては、標準製剤の規格及び試験方法に溶出試験が設定されている場合には、当該試験条件で溶出試験を行ってもよい。また、①あるいは②の試験液において 3 ロットとも 15 分以内に平均 85% 以上溶出する場合、いずれのロットを標準製剤にしてよい。

- ①規格及び試験方法に溶出試験が設定されている場合には、その溶出試験液。
- ②第 4 章に示した溶出試験条件の試験液の中で、少なくとも 1 ロットにおいて薬物が平均 85% 以上溶出

する場合は溶出速度が最も遅くなる試験液、いずれの溶出試験液においてもいずれのロットも平均 85% 以上溶出しない場合は溶出速度が最も速くなる試験液。

#### 試験製剤

標準製剤に対する含量違い製剤であって、実生産ロットと同じスケールで製造された製剤であることが望ましいが、実生産ロットの 1/10 以上の大きさのロットの製剤でもよい。なお、実生産ロットと同等性試験に用いるロットの製法は同じで、両者の品質及びバイオアベイラビリティは同等であるものとする。

徐放性製剤にあつては、標準製剤と大きさ、形状、比重、放出機構などが著しく異ならず、標準製剤と溶出挙動が類似していなければならない。溶出挙動の類似性については、平成 9 年 12 月 22 日付医薬審発第 487 号医薬安全局審査管理課長通知（平成 24 年 2 月 29 日付薬食審査発 0229 第 10 号一部改正）・別添「後発医薬品の生物学的同等性試験ガイドライン」（以下、「後発医薬品ガイドライン」という）の第 3 章、B. IV. 4. に示す基準による。

#### 難溶性薬物を含む製剤

後発医薬品ガイドラインの第 3 章、A. V. 3. 3) による。

### 第 3 章 製剤の処方変更水準と要求される試験

#### 1. 製剤の処方変更水準

処方変更水準は、基準処方を基にして計算する。表 1 又は表 2 に示す「添加剤の配合目的と成分」について、それぞれの変更の程度を求める。B 以下の場合には B 水準、B より大きく C 以下の場合には C 水準、C より大きく D 以下の場合には D 水準、D を超える場合には E 水準とする。

治療濃度域が狭い薬物を含む製剤、徐放性製剤、腸溶性製剤以外の医薬品における次の①から③の変更を表1、表2での変更の程度に関係なくA水準とする。

- ①微量記載成分を除くすべての成分の組成比が同一である変更\*
- ②有効成分の含有率の差が0.5%以内の変更であって、製剤質量が変わらないように賦形剤の分量を増減する変更
- ③「その他」に分類される成分を同じ配合目的で1.0%

(含有率の差の絶対値の和) 以内の範囲内で入れ替える変更 (例: 矯味剤から他の矯味剤への変更)

また、治療濃度域が狭い薬物以外の医薬品について、内核の質量あたりのフィルム層の質量の割合が7.0%以下のフィルム層の変更であって、付録3に従い、フィルム層が溶出に対して影響しないことを示した場合、表2のフィルム層の変更の程度に関係なくB水準とする。

製剤の処方変更水準は、それらの中で最も大きい水準とする。ただし、腸溶性製剤において、腸溶機能を有す

表1 非コーティング製剤の変更の程度

| 添加剤の配合目的と成分                         | 含有率の差 (%) |      |      |
|-------------------------------------|-----------|------|------|
|                                     | B         | C    | D    |
| 崩壊剤                                 |           |      |      |
| でんぷん                                | 3.0       | 6.0  | 9.0  |
| その他                                 | 1.0       | 2.0  | 3.0  |
| 結合剤                                 | 0.50      | 1.0  | 1.5  |
| 滑沢剤・光沢化剤                            |           |      |      |
| ステアリン酸塩                             | 0.25      | 0.50 | 0.75 |
| その他                                 | 1.0       | 2.0  | 3.0  |
| 流動化剤                                |           |      |      |
| タルク                                 | 1.0       | 2.0  | 3.0  |
| その他                                 | 0.10      | 0.20 | 0.30 |
| 賦形剤                                 | 5.0       | 10   | 15   |
| その他(防腐剤, 矯味剤, 安定剤など)* <sup>1)</sup> | 1.0       | 2.0  | 3.0  |
| 変更した成分の含有率の差の絶対値の和                  | 5.0       | 10   | 15   |

\*<sup>1)</sup> 「その他」に分類される添加剤においても、配合目的毎に含有率の差を計算し、変更水準を求める。  
微量記載成分は除く

表2 コーティング製剤の変更の程度

| 部分                   | 添加剤の配合目的と成分   | 含有率の差又は変更率 (%) |      |      |
|----------------------|---|----------------|------|------|
|                      |   | B              | C    | D    |
| 内核                   | 崩壊剤   |                |      |      |
|                      | でんぷん  | 3.0            | 6.0  | 9.0  |
|                      | その他   | 1.0            | 2.0  | 3.0  |
|                      | 結合剤   | 0.50           | 1.0  | 1.5  |
|                      | 滑沢剤・光沢化剤  |                |      |      |
|                      | ステアリン酸塩   | 0.25           | 0.50 | 0.75 |
|                      | その他   | 1.0            | 2.0  | 3.0  |
|                      | 流動化剤  |                |      |      |
|                      | タルク   | 1.0            | 2.0  | 3.0  |
|                      | その他   | 0.10           | 0.20 | 0.30 |
|                      | 賦形剤   | 5.0            | 10   | 15   |
|                      | その他* <sup>1)</sup> (防腐剤, 矯味剤, 安定剤など)* <sup>1)</sup> | 1.0            | 2.0  | 3.0  |
|                      | 内核で変更した成分の含有率の差の絶対値の和                               | 5.0            | 10   | 15   |
| フィルム層* <sup>2)</sup> | フィルム層で変更した成分の含有率の差の絶対値の和* <sup>1)</sup>             | 5.0            | 10   | 15   |
|                      | 内核の単位表面積あたりのフィルム層の質量の変更率* <sup>3)</sup>             | 10             | 20   | 30   |
| 糖衣層                  | 糖衣層で変更した成分の含有率の差の絶対値の和* <sup>1)</sup>               | 5.0            | 10   | 15   |
|                      | 内核の単位表面積あたりの糖衣層の質量の変更率* <sup>3)</sup>               | 10             | 20   | 30   |

\*<sup>1)</sup> 「その他」に分類される添加剤においても、配合目的毎に含有率の差を計算し、変更水準を求める。  
微量記載成分は除く。

\*<sup>2)</sup> 防水皮膜、下掛け皮膜、腸溶性皮膜、放出制御皮膜など糖衣層以外のあらゆる皮膜。

\*<sup>3)</sup> 内核の表面積は、形状に即して計算する。形状に即して計算できないときには、内核の形を球とし、処方変更に伴って内核の比重は変化しないとみなしてもよい。

る基本構成単位の直径を 4 mm 未満から 4 mm 以上への変更、あるいはその逆の変更をする場合は、E 水準とし、後発医薬品ガイドライン第 3 章、B. II. 1. に従って食後投与試験を追加して実施し、後発医薬品ガイドライン第 3 章、A. II. 2. に従って判定する。

\* コーティング製剤にあっては、フィルム層、糖衣層のすべての成分の組成比が等しいことに加え、内核の単位表面積あたりのフィルム層質量、糖衣層質量が等しいことをいう。

## 2. 要求される試験

生物学的同等性試験は、原則として用量の上限を超えない範囲の同一投与量で行う。やむを得ず異なる投与量で試験を行う場合は、薬物動態パラメータを表示量に基づく投与量で補正する（ただし、投与量と薬物動態パラメータの間で線形性が成立する製剤に限る）。

溶出試験は、原則として 1 ベッセル中の有効成分量が高含量製剤の含量を超えない範囲で行う。

### A 水準

標準製剤の規格及び試験方法に溶出試験が設定されている場合には、当該試験条件で溶出試験（12 ベッセル以上）を行う。標準製剤の規格及び試験方法に溶出試験が設定されていない場合には、第 4 章に示す溶出試験を行う。第 5 章に示す判定基準により溶出挙動が同等と判定されるとき、試験製剤と標準製剤は生物学的に同等とみなす。

溶出試験結果から生物学的に同等とみなされなかった場合には、後発医薬品ガイドラインに従って生物学的同等性試験を行う。

### B 水準

第 4 章に示す溶出試験を行う。ただし、フィルム層が溶出に対して影響しないことを示したフィルム層の変更を行う場合で、標準製剤が、本ガイドラインに規定されたいずれの溶出試験条件でも平均 85% 以上溶出しない医薬品は、上記 A 水準に規定される試験を行うことでよい。第 5 章に示す判定基準により溶出挙動が同等と判定されるとき、試験製剤と標準製剤は生物学的に同等とみなす。

溶出試験結果から生物学的に同等とみなされなかった場合には、後発医薬品ガイドラインに従って試験を行う。

### C 水準

即放性製剤及び腸溶性製剤にあっては、第 4 章に示す溶出試験を行う（難溶性薬物を含む製剤を除く）。第 5 章に示す判定基準により溶出挙動が同等と判定されるとき、試験製剤と標準製剤は生物学的に同等とみなす。ただし、表 3 に示す薬物を含む製剤（以下、「治療濃度域が狭い薬物を含む製剤」という）にあっては、第 4 章に示すいずれの条件においても試験製剤及び標準製剤の 30 分の平均溶出率がともに 85% 以上であり、且つ、第 5 章に示す判定基準により溶出挙動が同等と判定されるときに、試験製剤と標準製剤を生物学的に同等とみなす。溶出試験結果から生物学的に同等とみなされなかった場合は、後発医薬品ガイドラインに従って生物学的同等性試験を行う。

難溶性薬物を含む製剤にあっては、後発医薬品ガイドラインに従って生物学的同等性試験を行う。

徐放性製剤にあっては、第 4 章に示す溶出試験を行う（治療濃度域が狭い薬物を含む製剤を除く）。第 5 章に示

表 3 治療濃度域が狭い薬物\* 1)

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| アブリンジン              | イソブレンナリン    |
| エチニルエストラジオール        | エトスクシミド     |
| カルバマゼピン             | キニジン        |
| グアネチジン              | クリンダマイシン    |
| クロナゼパム              | クロニジン       |
| ジギトキシン              | シクロスポリン     |
| ジゴキシン               | ジソピラミド      |
| スルフォニルウレア系血糖降下剤* 2) | ゾニサミド       |
| タクロリムス              | テオフィリン類* 3) |
| バルプロ酸               | フェニトイン      |
| フェノバルビタール           | プラゾシン       |
| プリミドン               | プロカインアミド    |
| メトトレキサート            | リチウム        |
| ワルファリン              | グリブゾール      |

\* 1) 平成 11 年以降に承認される有効成分については、上記リストを参考にして、治療濃度域が狭い薬物であるかどうかを決定する。

\* 2) グリベンクラミド、トルブタミド、グリクロピラミド、アセトヘキサミド、トラザミド、グリクラジド

\* 3) テオフィリン、ジプロフィリン、プロキシフィン、アミノフィリン、コリンテオフィリン

す判定基準により溶出挙動が同等と判定されるとき、試験製剤と標準製剤は生物学的に同等とみなす。溶出試験結果から生物学的に同等とみなされなかった場合は、後発医薬品ガイドラインに従って生物学的同等性試験を行う。

治療濃度域が狭い薬物を含む製剤にあつては、後発医薬品ガイドラインに従って生物学的同等性試験を行う。

#### D 水準

即放性製剤にあつては、第4章に示す溶出試験を行う（難溶性薬物を含む製剤及び治療濃度域が狭い薬物を含む製剤を除く）。第4章に示すいずれの条件においても試験製剤及び標準製剤の30分の平均溶出率がともに85%以上であり、且つ、第5章に示す判定基準により溶出挙動が同等と判定されるとき、試験製剤と標準製剤は生物学的に同等とみなす。溶出試験結果から生物学的に同等とみなされなかった場合は、後発医薬品ガイドラインに従って生物学的同等性試験を行う。

難溶性薬物を含む製剤及び治療濃度域が狭い薬物を含む製剤にあつては、後発医薬品ガイドラインに従って生物学的同等性試験を行う。

腸溶性製剤及び徐放性製剤にあつては、後発医薬品ガイドラインに従って生物学的同等性試験を行う。

#### E 水準

後発医薬品ガイドラインに従って生物学的同等性試験を行う。

### 第4章 溶出試験

後発医薬品ガイドラインの第3章A、V及び第3章B、IVに従って試験を行う。ただし、パドル法の回転数は、50回転に替えて75回転で試験することはできない。水において薬物が添加剤やベッセルに吸着する場合、水に替えて、0.2%塩化ナトリウム溶液を用いてよい。難溶性薬物を含む製剤の試験においてポリソルベート80を添加する場合、その濃度は0.1%以下とする。また、腸溶性製剤にあつては下記に示す条件の試験を追加する。ラウリル硫酸ナトリウムを用いた場合の薬物の溶解度は、ポリソルベート80濃度が規定されている最大濃度の場合の溶解度を超えてはならない。

試験：0.01 mol/Lリン酸水素二ナトリウムと0.005 mol/Lクエン酸を用いてpH 6.0に調整した900 mLの試験液を用いるパドル法、50回転

### 第5章 溶出挙動の同等性の判定

溶出試験条件それぞれについて、以下に示す(1)及び(2)の基準を満たすとき、溶出挙動が同等と判定する。ただし、規定された試験時間内に少なくとも1つの溶出試験条件において、即放性製剤及び腸溶性製剤については標準製剤の平均溶出率が85%に、また、徐放性製剤

については標準製剤の平均溶出率が80%に達しなければならない。

なお、「規定された試験時間」とは、後発医薬品ガイドラインの第3章A、V、2.又は、第3章B、IV、2.に規定された試験時間のことである。また、 $f_2$ 関数により判定を行う場合の溶出率を比較する時点は付録1(2)による。即放性製剤及び腸溶性製剤では、標準製剤、試験製剤のいずれかの溶出にラグ時間があるときには、溶出曲線をラグ時間で補正することができ(付録2)、この場合には基準はラグ時間以降について適用する。ただし、溶出曲線を補正する場合、試験製剤と標準製剤の平均溶出ラグ時間の差は10分以内でなければならない。

比較時点が15分未満となる場合、比較時点をも15分として溶出挙動の評価を行ってもよい。なお、ラグ時間補正をする場合、比較時点15分とは補正前の時間である。

腸溶性製剤においては、溶出試験液がpH 1.2の場合、既定された試験時間(2時間後)の溶出率だけで溶出挙動の評価を行ってもよい。

#### (1) 平均溶出率

- ①標準製剤が15分以内に平均85%以上溶出する場合 試験製剤が15分以内に平均85%以上溶出するか、又は15分における試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 $\pm 10\%$ の範囲にある。
- ②標準製剤が15～30分に平均85%以上溶出する場合 標準製剤の平均溶出率が約60%及び85%となる適当な2時点において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 $\pm 10\%$ の範囲にあるか、又は $f_2$ 関数の値が50以上である。
- ③標準製剤が30分以内に平均85%以上溶出しない場合、以下のいずれかの基準に適合する。

#### 即放性製剤及び腸溶性製剤

- a. 規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が85%以上となるとき、標準製剤の平均溶出率が40%及び85%付近の適当な2時点において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 $\pm 10\%$ の範囲にあるか、又は $f_2$ 関数の値は50以上である。
- b. 規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が50%以上85%に達しないとき、標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の1/2の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 $\pm 8\%$ の範囲にあるか、又は $f_2$ 関数の値が55以上である。
- c. 規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が50%に達しないとき、標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の1/2の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試

験時間において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 ± 6% の範囲にあるか、又は  $f_2$  関数の値が 61 以上である。ただし、規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が 10% 以下の場合、規定された試験時間でのみ評価し、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 ± 6% の範囲にある。

#### 徐放性製剤

- a. 規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が 80% 以上に達するとき、標準製剤の平均溶出率が 30%、50%、80% 附近の適当な 3 時点において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 ± 10% の範囲にあるか、又は  $f_2$  関数の値が 50 以上である。
- b. 規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が 50% 以上 80% に達しないとき、標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 ± 8% の範囲にあるか、又は  $f_2$  関数の値が 55 以上である。
- c. 規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が 50% に達しないとき、標準製剤が規定された試験時間における平均溶出率の 1/2 の平均溶出率を示す適当な時点、及び規定された試験時間において、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 ± 6% の範囲にあるか、又は  $f_2$  関数の値が 61 以上である。ただし、規定された試験時間において標準製剤の平均溶出率が 10% 以下の場合、規定された試験時間でのみ評価し、試験製剤の平均溶出率が標準製剤の平均溶出率 ± 6% の範囲にある。

#### (2) 個々の溶出率

最終比較時点における試験製剤の個々の溶出率について、以下のいずれかの基準に適合する。

- a. 標準製剤の平均溶出率が 85% (徐放性製剤では 80%) 以上に達するとき、試験製剤の平均溶出率 ± 15% の範囲を超えるものが 12 個中 1 個以下で、± 25% の範囲を超えるものがない。
- b. 標準製剤の平均溶出率が 50% 以上に達し 85% (徐放性製剤では 80%) に達しないとき、試験製剤の平均溶出率 ± 12% の範囲を超えるものが 12 個中 1 個以下で、± 20% の範囲を超えるものがない。
- c. 標準製剤の平均溶出率が 50% に達しないとき、試験製剤の平均溶出率 ± 9% の範囲を超えるものが 12 個中 1 個以下で、± 15% の範囲を超えるものがない。

#### 付録 1. $f_2$ 関数と溶出率比較時点

##### (1) $f_2$ 関数の定義

$f_2$  の値は、次の式で表す。

$$f_2 = 50 \log \left[ \frac{100}{\sqrt{1 + \frac{\sum_{i=1}^n (T_i - R_i)^2}{n}}} \right]$$

ただし、 $T_i$  及び  $R_i$  はそれぞれ各時点における試験製剤及び標準製剤の平均溶出率、 $n$  は平均溶出率を比較する時点の数である。

##### (2) 溶出率比較時点

- ① 標準製剤が 15 分～30 分に平均 85% (徐放性製剤では 80%) 以上溶出する場合 15 分、30 分、45 分。
- ② 標準製剤が 30 分以降、規定された試験時間以内に平均 85% (徐放性製剤では 80%) 以上溶出する場合標準製剤の平均溶出率が約 85% (徐放性製剤では 80%) となる適当な時点  $T_a$  とするとき、 $T_a/4$ 、 $2T_a/4$ 、 $3T_a/4$ 、 $T_a$ 。
- ③ 標準製剤が、規定された試験時間以内に平均溶出率が 85% (徐放性製剤では 80%) に達しない場合規定された試験時間における標準製剤の平均溶出率の約 85% (徐放性製剤では 80%) となる適当な時点  $T_a$  とするとき、 $T_a/4$ 、 $2T_a/4$ 、 $3T_a/4$ 、 $T_a$ 。

#### 付録 2. ラグ時間による溶出曲線の補正方法

製剤から薬物が表示含量の 5% 溶出するまでに要する時間をラグ時間とする。ラグ時間は、個々の製剤ごとに溶出曲線から内挿法により求める。

試験製剤及び標準製剤について、個々の製剤の溶出曲線ごとにラグ時間を差し引いた溶出曲線を求める。これに基づいて試験製剤及び標準製剤の平均溶出曲線を求め、得られた 2 つの平均溶出曲線についての同等性を評価する。

#### 付録 3. フィルム層の溶出に対する影響の評価法

- (1) 標準製剤が、本ガイドラインに規定されたいずれかの溶出試験条件で平均 85% 以上溶出する医薬品の場合

標準製剤及び試験製剤それぞれの内核錠 (素錠) 及びフィルムコーティング錠について本ガイドライン第 4 章に従って溶出試験を行い、内核錠に対してフィル

ムコーティング錠がそれぞれ第5章に示す判定基準により溶出挙動が同等と判定されるとき、フィルム層が溶出に対して影響しないとみなす。なお、標準製剤及び試験製剤と同等の製造方法及び製造工程で製造された内核錠（素錠）及びフィルムコーティング錠を用いてもよい。

(2) 標準製剤が、本ガイドラインに規定されたいずれの溶出試験条件でも平均85%以上溶出しない医薬品の場合

アセトアミノフェン等の溶解度の高い薬物をモデル薬物として用い、有効成分以外の添加剤組成が同じであり、かつ、すべての溶出試験条件で平均85%以上

溶出する内核錠を得る。得られた内核錠に変更前後のフィルム層をそれぞれ施し、変更前後のモデルフィルムコーティング錠とする。

内核錠及び変更前後のモデルフィルムコーティング錠について本ガイドライン第4章に従って溶出試験を行い、内核錠に対してそれらの製剤がそれぞれ第5章に示す判定基準により溶出挙動が同等と判定されるとき、フィルム層が溶出に対して影響しないとみなす。なお、上記(1)又は(2)のいずれの場合であっても、フィルム層の変更前後においてその組成比が同じ場合、フィルム層が厚い方（つまり、フィルム層の質量が大きい方）の製剤のみについて内核錠との比較試験を行うことでよい。

## 付録 4. 製剤の処方変更水準と要求される試験

(含量が異なる経口固形製剤の生物学的同等性試験ガイドライン)

| 水準 | 即放性製剤/<br>徐放性製剤           | 治療濃度域*1 | 非難溶性/<br>難溶性 | 速溶出*3/<br>非速溶出 | 生物学的同等性の確認   |
|----|---------------------------|---------|--------------|----------------|--|
| A  | 即放性製剤                     | 広       |              |                | 溶出試験の規格が設定されている場合：規格に示す溶出試験で溶出挙動が同等のとき生物学的同等とみなす。溶出試験の規格が設定されていない場合：第4章に示す溶出試験で溶出挙動が同等のとき生物学的同等とみなす。   |
| B  | 即放性製剤<br>腸溶性製剤*2<br>徐放性製剤 |         |              |                | 第4章に示す溶出試験で溶出挙動が同等のとき生物学的同等とみなす。ただし、フィルム層が溶出に対して影響しないことを示したフィルム層の変更を行う場合で、標準製剤が、本ガイドラインに規定されたいずれの溶出試験条件でも平均85%以上溶出し、溶出し、A水準に規定される試験を行い、溶出挙動が同等のとき生物学的同等とみなす。 |
| C  | 即放性製剤<br>腸溶性製剤*2          | 広       | 非難溶性         |                | 第4章に示す溶出試験で溶出挙動が同等のとき生物学的同等とみなす。   |
|    |                           | 狭       | 難溶性          | 速溶出<br>非速溶出    | 後発医薬品ガイドラインに従う。<br>第4章に示す溶出試験で溶出挙動が同等のとき生物学的同等とみなす。  |
| D  | 即放性製剤                     | 広       | 非難溶性         | 速溶出<br>非速溶出    | 第4章に示す溶出試験で溶出挙動が同等のとき生物学的同等とみなす。   |
|    |                           | 狭       | 難溶性          |                | 後発医薬品ガイドラインに従う。  |
| E  | 即放性製剤<br>腸溶性製剤*2<br>徐放性製剤 |         |              |                | 後発医薬品ガイドラインに従う。  |

\*1 広：表3に含まれない薬物。狭：表3に含まれる薬物。

\*2 腸溶機能を有する基本構成単位の直径を4mm未満から4mm以上への変更、あるいはその逆の場合はE水準で食後投与試験を追加する。

\*3 第4章に示すいずれの条件においても試験製剤及び標準製剤の30分の平均溶出率がともに85%以上。